

USO ORAL  
USO VETERINÁRIO



# Primociclin

100 mg  
COMPRIMIDOS

## ANTIMICROBIANO DE LARGO ESPECTRO DE AÇÃO PARA CÃES E GATOS

### FÓRMULA:

Cada comprimido contém:

Enrofloxacinio ..... 100 mg  
Excipiente q.s.p ..... 200 mg

### INDICAÇÕES:

**Primociclin** atua contra infecções dos cães e gatos causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacinio. É especialmente indicado nas:

- **Infecções dérmicas** (piodermites) causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.* e *Proteus mirabilis*.
  - **Infecções respiratórias** (pneumonias) causadas por *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas spp.* e *Mycoplasma spp.*
  - **Infecções entéricas** (diarreias) primárias ou secundárias causadas por *Escherichia coli*, *Campylobacter spp.* e *Salmonella spp.*
  - **Infecções do ouvido** (otites) causadas por *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* e *Proteus spp.*
  - **Infecções geniturinárias** causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Mycoplasma spp.* e *Klebsiella spp.*
- É também indicado na profilaxia das infecções pós-operatórias como castrações, laparotomias e lesões acidentais.

### VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Via oral, puro ou misturado a alimentos sólidos, de acordo com o peso do animal a ser tratado.

### POSOLOGIA:

A dose média recomendada é de 5,0 mg de Enrofloxacinio por Kg de peso, sendo: 1 comprimido de **Primociclin 100 mg** para cada 20 kg de peso vivo uma vez ao dia.

QUANDO NECESSÁRIO PARTIR O COMPRIMIDO UTILIZÁ-LO EM ATÉ 72 HORAS.

### DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

De 3 a 5 dias consecutivos, sendo recomendado prolongar o tratamento por, no mínimo, 48 horas após o desaparecimento dos sintomas. As possíveis alterações da posologia recomendada, devem ser determinadas pelo Médico Veterinário.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

Não administrar o produto a cães de raças pequenas e médias, no período de 2 a 8 meses de idade (fase de crescimento rápido). Nas raças grandes este período pode chegar a 18 meses. Não administrar o produto a gatos com menos de 2 meses de idade. Não administrar em fêmeas prenhes. Evitar o uso na lactação.

### EFEITOS COLATERAIS:

Podem ocorrer náuseas, vômitos, elevação das transaminases, pruridos e urticárias nos animais sensíveis. Erosão das cartilagens nos animais em fase de crescimento.

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Evitar o uso associado de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio pois eles reduzem a absorção do enrofloxacinio. Não administrar concomitantemente com teoflina, a interação envolve inibição competitiva na metabolização do enrofloxacinio

### APRESENTAÇÃO:

Blister contendo 10 ou 20 comprimidos, acondicionados em cartucho.

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Conservar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance das crianças.

Responsável Técnico: Dr. Rogério de Souza Costa - CRF-RJ 6780.

Licença provisória no Ministério da Agricultura nº 084 em 13/02/03, emitida de acordo com o artigo 3º, Parágrafo 4º do Decreto-Lei nº 467/69.

Proprietário e Fabricante:

**COVELI**

COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua Ari Barroso, 458/530 - Duque de Caxias - RJ  
CEP 25085-480 - CNPJ 33.927.419/0001-42  
Indústria Brasileira - Marca Registrada  
www.covelli.com.br



TEL.: (21) 3419-7329  
Caixa Postal: 37067  
CEP 22622-970 - RJ  
sac@covelli.com.br